

Aftalt operationstid: _____ Aftalt kontroltid: _____

Inden operationen

Hvis det er bestemt, at barnet skal have isat dræn, have fjernet polypper eller reduceret mandlerne, foregår dette i en kort fuld narkose. Klinikken har fast samarbejde med speciallæge i anæstesiologi Jakob Stegger.

Hvis barnet om morgenen på operationsdagen har feber over 38°C og/eller besværet vejrtrækning, kan det medføre aflysning. Hvis sygdommen skyldes mellemøretbetændelse kan barnet dog som regel opereres alligevel. Opkastning inden for det sidste døgn medfører aflysning på grund af risiko for opkast til lungerne i forbindelse med bedøvelsen. Kontakt klinikken, hvis I er i tvivl.

Barnet skal have praktisk, ikke fint tøj på. Barnet må ikke have strømpebukser på. Barnet må ikke have neglelak på fingrene og tæerne.

Det er **ikke hensigtsmæssigt at andre søskende medbringes** på operationsdagen.

Faste

Barnet skal møde **fastende!**

Indtil 6 timer før operationen må barnet spise og drikke normalt. Ingen mad (inkl. slik og tyggegummi) eller mælkeprodukter herefter!

Indtil 4 timer før operationen må barnet få brystmælk.

Indtil 2 timer før operationen må barnet drikke vand, saftvand og juice uden frugtkød. Intet herefter, ej heller tandbørstning.

Forældre **skal** spise morgenmad, så I har energi til at støtte jeres barn.

Medicin

Får barnet inhalationsmedicin, f.eks. for astma, skal det tages om morgenen før operationen.

Anden medicin såsom epilepsimedicin og smertestillende tages med lidt vand senest to timer før operationen.

Sådan foregår indgrebet

I bliver hentet af lægen, som ledsager jer til operationsstuen. Der foretages identifikation med navn og cpr-nummer. Aftalte indgreb bekræftes.

Narkoselægen holder masken for barnets mund, og ganske kort tid efter sover barnet. Der bedøves med en blanding af ilt og Sevoflourane. Forældrene er med hos barnet under indledningen. Når barnet sover, bliver I bedt om at vente i venteværelset, til vi kalder jer ind på opvågningsrummet.

Opvågning

Barnet vil på opvågningen være observeret.

Man kan forvente lidt uro i opvågningsfasen, som ellers er kort. Typisk er barnet friskt igen efter 10 min. Opkastning er meget sjældent forekommende efter drænanlæggelse, men det kan forekomme efter fjernelse af polypper eller operation på mandler.

På hjemturen skal barnet ledsages af en voksen foruden føreren af bilen.

Barnet må først spise, når det har forladt klinikken igen (af hensyn til de andre fastende børn).

Sygedage

Ved dræn anbefales det, at barnet bliver hjemme resten af dagen efter operationen.

Ved polypper anbefales det, at barnet bliver hjemme samme dag og evt. også dagen efter, hvis barnet stadig ikke er helt friskt.

Ved kraftig blødning ringes 112.